

¿Cómo se usa?

15:00 hrs.	2 Mifepristonas
18:00 hrs.	2 Mifepristonas
20:00 hrs.	2 Mifepristonas
21:00 hrs.	4 Misotrol Sublingual (1 comprimido c/5 minutos). Las Pastillas se derriten en la boca y luego se tragan.
01:00 hrs.	4 Misotrol Sublingual (1 comprimido c/5 minutos). Las Pastillas se derriten en la boca y luego se tragan.
01:00 - 03:00 hrs.	Dolor abdominal, sensación de quemazón en el bajo vientre, escalofríos (otras complicaciones: Diarrea, Cefalea, Diaforesis, Fiebre, Palpitaciones, Vómitos).
03:00 hrs.	Opcional 1 tramadol.
05:00 hrs.	4 Misotrol Sublingual (1 comprimido cada 5 minutos). Las pastillas se derriten en en la boca y luego se tragan.
06:00 hrs.	Opcional: 1 tramadol.
07:00 - 09:00 hrs.	Aumenta el Dolor y comienza la Hemorragía.
10:00 hrs.	Opcional:1 tramadol.
14:00 hrs.	1 Cefadroxilo.
14:00 hrs	1 Cefadroxilo (día siguiente).

... Realizar ecografía 5 días después de finalizado el sangrado.

¿Cómo se usa?

17:00 hrs. 2 Mifepristonas
20:00 hrs. 2 Mifepristonas
23:00 hrs. 2 Mifepristonas } **Vía Oral + Agua**

23:00 / 00:00 hrs. Orinar, luego lavado vaginal con jeringa de 5ml. con agua tibia (3 a 5 veces).

00:00 hrs. 1 Misotrol cada 5 minutos vía Vaginal. Remojar en agua cada pastilla por 3 segundos. Posición acostada con rodillas flectadas y soporte en la espalda baja. Permanecer en esta posición 2 a 3 horas mínimo.



01:00 / 02:00 hrs. Dolor abdominal, sensación de quemazón vientre bajo, escalofríos (otras complicaciones: Diarrea, cefalea, diaforesis, fiebre, palpitaciones, vómitos).

03:00 hrs. Opcional: 1 Tramadol.

05:00 / 07:00 hrs. Aumenta el Dolor y viene la hemorragia.

07:00 hrs. Opcional: 1 Tramadol.

12:00 hrs. 1 Cefradoxilo

Día Siguiente

12:00 hrs. 1 Cefradoxilo

Realizar ecografía 5 días después de finalizado el sangrado.